

Bijvoeden tamme konijntjes met Beaphar Knaagdier- en Konijnenmelk



Wanneer?

Als de voedster onvoldoende melk heeft of de jongen nog te weinig zelf kunnen drinken en snel vermoeid zijn.

Wanneer de jongen heel erg onrustig zijn of zelfs uit het nest kruipen, (dit doen ze als ze honger of dorst hebben).

Als de jongen rimpelig zijn, dan zijn ze aan het uitdrogen en hebben dringend O.R.S. nodig.

Eerst O.R.S. Dan pas melk (Dit moet altijd ongeacht de leeftijd)

De kleintjes krijgen de eerste 5 voedingen alleen O.R.S. (elektrolyten oplossing). O.R.S. is onder verschillende namen en merken te koop bij drogist, apotheek en dierenarts. Deze elektrolyten geeft u 1 tot 2 ml per keer om de 3 uur behalve 's nachts. De oplossing is 24 uur te bewaren in de koelkast. Breng het spuitje zonder speen voorzichtig aan de zijkant vlak achter de voortandjes tussen de lipjes, met speen gewoon aan de voorkant, en geef de vloeistof echt druppelsgewijs, wacht tot het diertje slikt en dan de volgende druppel, anders verslikken ze zich. Zodra ze het door hebben gaat het vlugger en makkelijker, maar zeker nooit overhaasten.

Via O.R.S naar melkvoeding

De 6^e voeding (zie voerschema onderaan) wordt er ½ melk met ½ O.R.S. gegeven. De 7^e voeding ½ melk en ½ O.R.S.

De 8^e voeding ¾ melk en ¼ O.R.S. Daarna gewoon volgens het schema met de melk verder gaan.

Hoe te handelen met de kleintjes

Is de voedster niet agressief tegen de jongen, laat ze dan gewoon bij de moeder. U haalt ze er even uit om vocht of voeding te geven en zet ze weer terug. Kunnen ze niet bij moeder blijven, dan dienen ze in een plastic bak met een fleecedekentje als bodembedekking op een rustige plek onder een warmtelamp gehouden te worden.

De kap met beveiligingskorf voor de warmtelamp ziet u hiernaast, met een warmtelamp van 150 watt. Zeker de eerste 14 dagen is een warmtebron van levensbelang.

De warmtelamp dient 60 – 65 cm boven de ligplaats met de jongen te hangen, gemeten vanaf de jongen en niet vanaf de bovenzijde van het verblijf. Dit een paar keer controleren door te voelen in het nekje, dat moet behaaglijk warm aanvoelen, niet lauwwarm of heet.

Een lichtgekleurde fleecedeken is handig omdat u dan goed kan zien of ze keutelen en al zelf plassen. Een extra vierkant geknipt stukje fleecedeken kan als een soort holletje neergelegd worden, ze schuilen daar onder wanneer ze even koeler willen liggen. Wanneer de jongen de oogjes open hebben mogen ze vanaf dat moment ook altijd een pluk hooi en een bakje (geen flesje) water (in het begin een klein laagje) in de bak hebben. Ze moeten 24/7 over hooi en schoon drinkwater kunnen beschikken. Zodra ze het hooi ook echt goed eten, dan kunt u beginnen met brokjes. Geef er eerst een paar uit de hand tot ze er echt van eten, dan pas een bakje neer zetten. Met groenvoer wachten tot ze minstens 3 weken oud zijn en de melk rustig aan wordt afgebouwd. Kruik of elektrisch dekentje zijn eventuele noodoplossingen, een warmtelamp blijft de beste optie. Ze zijn niet zo erg duur en zijn verkrijgbaar bij winkels zoals de Boerenbond, Welkoop, Horticoop en vergelijkbare zaken. Zodra ze de warmtebron niet meer nodig hebben, kunnen ze in een groter verblijf met een lekkere laag hooi als bodembedekker erin (prettiger dan stro voor de kleintjes) en een paar keer per dag een plukje hooi om van te knabbelen en altijd vers water. Geen flesje, dit verhoogt het risico op gasvorming.



Wegen

Weeg de diertjes altijd vóór u de eerste keer vocht of voeding gaat geven. De eerste paar dagen kunnen ze iets afvallen, na ongeveer een week zullen ze zeker moeten gaan aankomen.

Hulp bij plassen

De eerste 3 tot 4 dagen moeten de kleintjes geholpen worden bij het plassen. Neem een zachte tissue en wrijf zachtjes over het onderbuikje en geslachtsdeel om de urinestroom op gang te brengen, en ga daarmee door tot het stopt met plassen. Keutelen kunnen ze wel direct zelf, let alleen op dat het mooie droge keuteltjes blijven.

Melk aanmaken

Kijk in het voedingsschema hoeveel u klaar moet maken, maak dan een hoeveelheid voor de hele dag. De melk kan het beste minstens 4 uur van tevoren worden klaargemaakt, zo nemen de poeders het water goed op. *Weeg 9 gram Beaphar af en doe daar 17 ml water bij om 25 ml melk te krijgen. Het water moet minstens 80° C zijn. Goed roeren tot de poeder geheel is opgelost en er geen klontjes in zitten. Laat de melk afkoelen en zet het in de koelkast (24 uur houdbaar). De melk moet iets dunner zijn dan magere yoghurt, wel zo vloeibaar dat het makkelijk door de speen kan.

*) De hoeveelheid die nodig is, kan je op het schema berekenen door de aangegeven hoeveelheid te vermeerderen tot de hoeveelheid die er nodig is.

De speentjes en spuitjes

De speentjes hebben al een opening, niet doorprikken dus! Wel ter controle altijd het spuitje vullen met water, speentje er op en door het speentje spuiten. Eén of twee smalle straaltjes is prima! De spuit altijd weg doen als hij te stroef loopt, hij kan dan ineens doorschieten met verslikking van het kleintje tot gevolg. De spuitjes na gebruik uit elkaar halen, goed afspoelen en uit elkaar bewaren, pas in elkaar zetten als ze weer gebruikt worden, zo gaan ze het langst mee.

Twee soorten melk mengen

Een andere melksoort mengen met de nieuwe soort:

De eerste dag $\frac{2}{3}$ oude melk en $\frac{1}{3}$ nieuwe melk. De tweede dag half om half. De derde dag $\frac{1}{3}$ oude melk en $\frac{2}{3}$ nieuwe melk. De vierde dag alleen de nieuwe melk zoals aangegeven in het voerschema. Zo gaat het meestal probleemloos!

Het voeden

Gebruik in het begin altijd een 1 ml spuit, deze druppelt langzaam en loopt lichter dan de grotere. Plaats de speen op de spuit en duw die tot aan het smalle gedeelte van de speen, dit geldt ook voor de 3 ml. Bij de 5 ml en de 10 ml plaats je de speen alleen over het brede deel, ze moeten dan goed kunnen zuigen. Bij verslikken krijgen de diertjes meestal een longontsteking. Gebruik om diezelfde reden nooit flesjes, ook niet al zijn ze speciaal voor jonge dieren. Voor deze kleintjes zijn ze absoluut ongeschikt. De diertjes krijgen vaak te veel voeding in 1 keer naar binnen. Wat het risico op verslikking nog meer vergroot. Wacht bij happen naar lucht niet af maar ga meteen naar een dierenarts voor antibioticum (Novadox of gelijke).

Vasthouden

Zeer jonge diertjes houdt u rechtop (zoals ze staan of zoals het stokstaartje en iets voorover). Zodra ze goed zelf op 4 pootjes staan, laat u ze staan, leg uw hand om ze heen en steun ze door beide schouders met een vinger te omvatten. Zo steunt u ze en kunnen ze toch op hun voetjes blijven staan.



Melkformule

De Beaphar Knaagdier- en Konijnenmelk heeft toevoegingen van vet, mineralen en vitamines.

Melkproducten en benodigdheden zijn te bestellen via de website van Stichting KonijnenBelangen:

<http://www.konijnenbelangen.nl/winkel.php?wid=1&menu=winkel>

Voor hulp en advies bij het grootbrengen neem contact op met onze konijnenbaby-expert:

Tel: 0031(0)623392009 - Email: ria@konijnenbelangen.nl

Voedingsschema bijvoeden 1 keer per dag, liefst 's middags tussen 14:00 – 15:00 uur			
<i>Het schema is een richtlijn om de leeftijd te bepalen. Het gewicht bepaalt hoeveel het diertje per keer mag hebben. Dit schema is gebaseerd op het middenslag konijn (2,5 kilo). Een dwerg zal minder drinken en een reus meer.</i>			
Gewicht	Leeftijd	Bijvoeding	Uiterlijke kenmerken
20 gram	-	2 ml	
25 gram	-	3 ml	
30 gram	-	3 ml	
35 gram	-	4 ml	
40 gram	-	4 ml	
45 gram	1 dag	5 ml	
50 gram	2 dagen	5 ml	Kaal, navel zichtbaar, ogen dicht, oren plat
60 gram	3 dagen	6 ml	Vacht begint te groeien
70 gram	4 dagen	6 ml	
80 gram	5 dagen	7 ml	
90 gram	6 dagen	7 ml	Vanaf 8 dagen kunnen ze vaak al horen
100 gram	1 week	8 ml	
125 gram	10 dagen	8 ml	Ogen gaan open tussen de 10 ^e en 15 ^e dag
150 gram	2 weken	10 ml	Oren gaan overeind komen
200 gram	3 weken	15 ml	
250 gram	4 weken	20 ml	
300 gram	5 weken	15 ml	
375 gram	5,5 week	8 ml	
400 gram	6 weken	4 ml	Laatste keer melkvoeding

Voedingsschema bijvoeden 2 keer per dag, liefst tussen 11:00 – 12:00 uur en tussen 16:00 – 17:00

Het schema is een richtlijn om de leeftijd te bepalen en de hoeveelheid voeding die het moet hebben. Dit schema is gebaseerd op het middenslag konijn (2,5 kilo). Een dwerg ras zal wat minder drinken en een vlaamse reus meer.

Gewicht	Leeftijd	Eerste voeding	Tweede voeding	Uiterlijke kenmerken
20 gram	-	2 ml	2 ml	
25 gram	-	3 ml	3 ml	
30 gram	-	3 ml	3 ml	
35 gram	-	4 ml	4 ml	
40 gram	-	4 ml	4 ml	
45 gram	1 dag	5 ml	5 ml	
50 gram	2 dagen	5 ml	5 ml	Kaal, navel zichtbaar, ogen dicht, oren plat
60 gram	3 dagen	6 ml	6 ml	Vacht begint te groeien
70 gram	4 dagen	6 ml	6 ml	
80 gram	5 dagen	7 ml	7 ml	
90 gram	6 dagen	7 ml	7 ml	Vanaf 8 dagen kunnen ze vaak al horen
100 gram	1 week	8 ml	8 ml	
125 gram	10 dagen	8 ml	8 ml	Ogen gaan open tussen de 10 ^e en 15 ^e dag
150 gram	2 weken	8 ml	10 ml	Oren gaan overeind komen
200 gram	3 weken	10 ml	10 ml	
250 gram	4 weken	10 ml	10 ml	
300 gram	5 weken	5 ml	10 ml	
375 gram	5,5 week	-	8 ml	
400 gram	6 weken	-	4 ml	Laatste keer melkvoeding